

Cistoscopia

Cuidados después del procedimiento

Durante una cistoscopia se usa una pequeña cámara (endoscopio) para ver el interior de la vejiga a través de la uretra (conducto por donde sale la orina). Antes del procedimiento, usaremos medicina (anestesia) para dormir al paciente completamente y que no sienta dolor.

¿Qué puede suceder después de una cistoscopia?

Puede notar:

- Orina de color rosa hasta por 24 horas después del procedimiento.
- Ardor las primeras veces que orine después del procedimiento. Tomar mucha agua diluye la orina y reduce el ardor.
- Dificultad para orinar. Puede ser más fácil orinar sentado en una tina con agua calientita. Los niños y niñas más pequeños probablemente se orinen dormidos. Ese día, después del procedimiento, es mejor que orine al menos cada 3 horas mientras esté despierto.

¿Cuándo podrá comer?

- Cuando esté completamente despierto puede comenzar a beber líquidos claros como 7UP, gelatina, paletas de hielo y jugo de manzana.
- Las náuseas y los vómitos son comunes después de un procedimiento. Si esto ocurre, debe tomar líquidos claros poco a poco.
- Si no vomita ni tiene náuseas y está completamente despierto, puede regresar a su dieta normal.

¿Cuánta actividad puede hacer?

Durante el día de hoy vigílelo de cerca. La mayoría de los niños regresan a su actividad normal en 24 horas.

¿Cuándo debo llamar al médico?

Para preguntas o preocupaciones, llame a Urología de lunes a viernes al **206-987-2509**. Mande un mensaje si no es urgente por MyChart. Por las noches, fin de semana y días festivos llame a la central telefónica del hospital al **206-987-2000** y pida hablar con el urólogo de guardia para preocupaciones urgentes como:

- Fiebre de 101.5 F (38.6 C) o más.
- Orina de color rojo brillante o con mucha sangre.
- Dolor fuerte y constante en el sitio del procedimiento.
- No puede orinar por 8 a 12 horas después del procedimiento.

Más información

- Urología
206-987-2509
- Consulte con el proveedor de atención médica
- seattlechildrens.org

Servicio gratuito de intérprete

- En el hospital solicítelo al personal de enfermería.
- Fuera del hospital, llame a la línea gratuita de interpretación: 1-866-583-1527. Dígale al intérprete el nombre de la persona o la extensión que necesita.



Seattle Children's ofrece servicio gratuito de interpretación para pacientes, familiares y representantes legales sordos, con problemas de audición o que hablen un idioma que no sea inglés. Seattle Children's tendrá disponible esta información en formatos alternativos bajo solicitud. Por favor llame al Centro de Recursos para la Familia al 206-987-2201. Este volante fue revisado por personal clínico de Seattle Children's. Sin embargo, como las necesidades de cada persona son únicas, antes de depender de esta información, por favor consulte con el proveedor de atención médica.

© 2023 Seattle Children's Hospital, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados.

Cystoscopy

Care After Procedure

Cystoscopy is a procedure which uses a tiny camera (scope) to look into the bladder through the urethra (tube that empties pee or urine from the bladder). We will give your child medicine (anesthesia), so they are fully asleep and feel no pain before we do this procedure.

What should I expect after cystoscopy?

Your child may have the following:

- Pinkish urine up to 24 hours after the procedure.
 - Burning feeling while peeing the first few times after surgery. Give your child lots of water. Watering down the pee will help get rid of the burning or stinging feeling.
 - Difficulty peeing. It may help to have your child sit in a tub of warm water and try to pee. Smaller children will pee when they fall asleep. Have your child pee at least every 3 hours after surgery during the daytime.
-

When may my child eat?

- When fully awake, your child may have clear liquids like 7UP, Jell-O, Popsicles and apple juice.
 - Nausea and throwing up (vomiting) are common after surgery. If this occurs, slowly give your child a clear liquid diet.
 - If your child is not sick to their stomach (nausea) or throwing up, and is fully awake, your child may then start on their regular diet.
-

How much activity can my child do?

Watch your child closely today. Most children go back to normal activity in 24 hours.

When should I call a doctor?

Monday to Friday, call the Urology Clinic at **206-987-2509** for questions or any of the concerns listed below. Send MyChart messages for non-urgent questions.

Nights, weekends and holidays, call **206-987-2000** and ask for the Urology resident on call for urgent concerns from the following list:

- Fever higher than 101.5° F (38.6° C)
 - Bright red pee (urine) or a lot of blood
 - Severe, constant pain at the surgery site.
 - Cannot pee for 8 to 12 hours after surgery
-

To Learn More

- Urology
206-987-2509
- Ask your child's healthcare provider
- seattlechildrens.org

Free Interpreter Services

- In the hospital, ask your nurse.
- From outside the hospital, call the toll-free Family Interpreting Line, 1-866-583-1527. Tell the interpreter the name or extension you need.



Seattle Children's offers free interpreter services for patients, family members and legal representatives who are Deaf or hard of hearing or speak a language other than English. Seattle Children's will make this information available in alternate formats upon request. Call the Family Resource Center at 206-987-2201. This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children's. However, your needs are unique. Before you act or rely upon this information, please talk with your healthcare provider.

© 2023 Seattle Children's, Seattle, Washington. All rights reserved.

2/23
PE016