

Lo que puede ocurrir después del tratamiento láser en la piel

¿Qué sucede después del tratamiento?

- Su hijo tendrá un moretón o hinchazón después del tratamiento que durará de 1 a 2 semanas. La marca subyacente debe desaparecer lentamente en los próximos dos meses, pero puede no desaparecer por completo. Se necesitan varios tratamientos para lograr los mejores resultados para la desaparición de las manchas.
- Se puede formar una costra delgada o una ampolla sobre la zona tratada en los primeros días después del tratamiento con láser. Si se forma una ampolla o una costra, llámenos o envíenos un mensaje por MyChart.

¿Cuándo llamar al hospital?

Llámenos si tiene alguna duda o pregunta.

Llame si se forman ampollas o costras en la zona tratada. La infección es poco frecuente, pero puede provocar cicatrices y debe tratarse lo antes posible.

Algunos signos de infección:

- El dolor o enrojecimiento empeoran
- Costra amarilla o pus
- Fiebre superior a 100.5 °F (38.1 °C)

¿Qué cuidados necesitará mi hijo en casa?

- Puede haber hinchazón y ardor en las primeras 48 horas.
 - Use bolsas de hielo y eleve la zona tratada si es posible.
 - Repita según sea necesario para aliviar los síntomas.
- Puede darle acetaminofeno (Tylenol) cada 4 a 6 horas. Use este medicamento solo si se lo recomienda su proveedor de atención médica. Consulte primero a su proveedor de atención médica antes de dar cualquier tipo de medicamento a su hijo. Evite darle a su hijo aspirina o ibuprofeno (Motrin).
- Manipule la zona tratada con cuidado, sin frotar ni desprender las costras.
- Lave la zona cuidadosamente con agua tibia sin usar un paño durante la primera semana. Aplique una fina capa de vaselina o ungüento antibiótico al menos 2 veces al día hasta que desaparezca el moretón.

1 de 2

Más información

- Dermatología
206-987-2158
- Anomalías Vasculares
206-987-4606
- Preguntas por la noche o fin de semana: 206-987-2000. Pida hablar con el dermatólogo de guardia.
- Consulte con el proveedor de atención médica de su hijo
- seattlechildrens.org

Servicio gratuito de interpretación

- En el hospital solicítelo a la enfermera.
- En el hospital solicítelo a la enfermera. 1-866-583-1527. Dígale al intérprete el nombre de la persona o la extensión que necesita.



Seattle Children's®
HOSPITAL • RESEARCH • FOUNDATION

Lo que puede ocurrir después del tratamiento láser en la piel

- Si su hijo recibió anestesia durante el tratamiento láser, puede tener sueño y náuseas durante las primeras 24 horas. Deje que decida cuánto quiere comer, pero asegúrese de que beba mucho líquido.
 - Debe evitar la exposición al sol durante al menos un mes después del tratamiento y antes de cualquier otro tratamiento. Si no puede evitar el sol, use factor de protección solar SPF30 o superior. También cubra la piel con ropa y sombrero. Es importante evitar que el área tratada se broncee.
-

Seattle Children's ofrece servicio gratuito de interpretación para pacientes, familiares y representantes legales sordos, con problemas de audición o con inglés limitado. Seattle Children's tendrá disponible esta información en formatos alternativos bajo solicitud. Por favor, llame al Centro de Recursos para la Familia al 206-987-2201. Este volante fue revisado por personal clínico de Seattle Children's. Sin embargo, como las necesidades de su niño son únicas, antes de actuar o depender de esta información, por favor consulte con el proveedor de atención médica de su niño.

11/21
Tr (tp/jw)
PE1184S

© 2021 Seattle Children's Hospital, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados.

What to Expect After Skin Laser Treatment

What happens after treatment?

- Your child will develop a bruise or increased swelling after treatment. This bruise will last for 1 to 2 weeks. The underlying mark should slowly fade over the next couple of months. The spot may not go away completely. Multiple treatments are needed to get the best results fading the spots.
- A fine scab or blister may appear over the treated area in the first few days after the laser treatment. If a blister or scab forms, please call or message us in MyChart.

When should I call the clinic?

Call us if you have any concerns.

Call if there are blisters or scabs forming in the area treated. Infection is very rare but can result in scarring and should be treated as soon as possible.

Signs of infection include:

- worsening pain or redness at site
- yellow crust or pus
- fever above 100.5 F (38.1 C)

How do I care for my child at home?

- Your child may have some swelling and burning in the first 48 hours.
 - Use ice packs and keep the area treated raised if possible.
 - Repeat this as needed to help relieve the symptoms.
- You can give your child acetaminophen (Tylenol) every 4 to 6 hours. Use this medicine only if recommended by your healthcare provider. Check with your healthcare provider first before giving any type of medicine to your child. Avoid giving your child aspirin or ibuprofen (like Motrin).
- Handle the treated area with care. Do not rub the area or pick off any crust or scab.
- Wash the area gently with lukewarm water without a washcloth for the first week. Apply a thin layer of petroleum jelly or antibiotic ointment at least 2 times a day until the bruising goes away.

1 of 2

To Learn More

- Dermatology
206-987-2158
- Vascular Anomalies Clinic
206-987-4606
- For questions on evenings or weekends, call 206-987-2000 and ask the operator to page the dermatologist on call.
- Ask your child's healthcare provider
- seattlechildrens.org

Free Interpreter Services

- In the hospital, ask your nurse.
- From outside the hospital, call the toll-free Family Interpreting Line, 1-866-583-1527. Tell the interpreter the name or extension you need.



Seattle Children's®
HOSPITAL • RESEARCH • FOUNDATION

What to Expect After Skin Laser Treatment

- If your child had anesthesia during the laser treatment, they may be sleepy and nauseous for the first 24 hours. Let your child decide how much they want to eat during this time. Make sure they drink plenty of liquids.
 - Be very careful about having your child in the sun for at least a month after treatment and before any further treatments. If they cannot avoid the sun, have them use sunscreen of SPF 30 or more, sun protective clothing and hats. It is important that the treated area does not get tan or sunburned.
-

Seattle Children's offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and legal representatives free of charge. Seattle Children's will make this information available in alternate formats upon request. Call the Family Resource Center at 206-987-2201. This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children's. However, your child's needs are unique. Before you act or rely upon this information, please talk with your child's healthcare provider.

© 2021 Seattle Children's, Seattle, Washington. All rights reserved.

11/21
PE1184