


Cirugía de hipospadias para corrección de la uretra en el pene

Este folleto explica las hipospadias y la cirugía para corregirla.


¿Qué es hipospadias?

- La orina sale por un conducto en el pene llamado uretra. Los hipospadias ocurren cuando el orificio (meato) de la uretra no está en la punta, sino en algún otro lugar a lo largo de la parte inferior del pene o en el saco de piel (escroto) que contiene los testículos.
- Las hipospadias son muy comunes en recién nacidos. Los científicos están investigando si existe una relación (genética) hereditaria. No se conoce la causa exacta de las hipospadias.

**Un pene sin hipospadias
(el orificio está en la punta).**



Lugares donde puede estar el orificio por donde sale la orina en un pene con hipospadias.



¿Por qué las hipospadias son un problema?

- Si el orificio está en la parte inferior del pene puede ser difícil controlar el flujo de orina.
- Más adelante, las hipospadias pueden causar problemas para tener bebés (fertilidad). El orificio debe estar cerca o en la punta del pene para depositar esperma durante el sexo vaginal.
- Algunos niños con hipospadias tienen el pene curvo (encordamiento) cuando el pene se endurece (erección). Más adelante puede dificultar las relaciones sexuales.

¿Qué se puede hacer?

La cirugía es el método para corregir las hipospadias. No se corrige con medicamentos ni desaparece solo. La cirugía cambia el lugar del orificio a la punta del pene. Si tiene una curvatura o está doblado, se puede enderezar durante la misma cirugía.

1 de 2

Más información

- Urología
206-987-2509
- Consulte con el proveedor de atención médica
- seattlechildrens.org

Servicio gratuito de intérprete

- En el hospital solicítelo al personal de enfermería.
- Fuera del hospital, llame a la línea gratuita de interpretación: 1-866-583-1527. Dígale al intérprete el nombre de la persona o extensión que necesita.



Seattle Children's®
HOSPITAL • RESEARCH • FOUNDATION

Corrección de hipospadias: cuidados posoperatorios

¿Cuál es la mejor edad para esta cirugía?

En la mayoría de los casos, la corrección de las hipospadias se realiza entre los 6 y 18 meses de edad. Recomendamos esta edad porque el corazón y los pulmones del bebé ya han madurado y no ha desarrollado la memoria.

¿Qué sucede durante la cirugía?

La técnica que usan los cirujanos dependerá de la ubicación al nacer del orificio (meato) por donde sale la orina. El objetivo de la cirugía es colocar el orificio en la punta o cerca de la punta del pene y corregir cualquier curvatura. El cirujano le explicará cómo será la cirugía.

¿Qué sucede después de la cirugía?

Después de la cirugía, usaremos medicamentos para evitar molestias y gérmenes. Tendrá un apósito (vendaje) y un tubo plástico saliendo por la punta del pene llamado sonda o stent (endoprótesis). La sonda o stent drena la orina de la vejiga durante la recuperación. La quitaremos en aproximadamente 1 semana después de la cirugía durante una cita.

¿Cuáles son los riesgos de esta cirugía?

Todas las cirugías tienen algunos riesgos. Aunque la probabilidad es baja, algunos de los riesgos son: sangrado leve o grave durante o después de la cirugía, infección, hinchazón en el pene o un orificio en otro lugar (fistula). También, la anestesia general (medicamentos para dormir durante la cirugía para no sentir dolor) tiene algunos riesgos. El anestesiólogo se los explicará.

¿Se puede no hacer o retrasar la cirugía por alguna razón?

Si su niño tiene una afección médica que puede interferir con la cirugía, podemos sugerir no hacerla. Sus creencias y deseos también son importantes. Algunas personas no están de acuerdo con la cirugía en los genitales de sus hijos antes de tener la edad para tomar sus propias decisiones. Hable con el proveedor de atención médica si tiene preguntas o preocupaciones.

¿Cuándo llamar al médico?

Si tiene preguntas sobre hipospadias, encordamiento del pene o la cirugía, llame a Urología al **206-987-2509**. También puede mandar un mensaje por **MyChart** con preguntas que no sean urgentes.

Hypospadias Repair


Surgery to correct the urethra on a penis

This handout explains the condition hypospadias and the surgery to correct it.


What is hypospadias?

- Pee (urine) comes out of a tube in the penis called a urethra. Hypospadias occurs when the opening (meatus) of the urethra is not at the very tip, but somewhere along the underside of the penis or on the sac of skin containing the testicles (scrotum).
- Hypospadias (hye-peh-SPAY-dee-iss) is very common in newborns. Scientists are researching to see if there is a hereditary (genetic) link. We do not know the exact cause of hypospadias.

A penis with no hypospadias
(the opening is at the tip).



Places where the opening can be
on a penis with hypospadias.



Why is hypospadias a problem?

- If the hole is on the underside of the penis, it can be hard for your child to control their urine stream.
- Hypospadias can also cause problems with the ability to make a baby later in life (fertility). The hole needs to be at or near the tip of the penis to deposit sperm during vaginal sex.
- Also, some children with hypospadias have a bent penis (chordee) when the penis gets hard (an erection). Chordee can make sex with other people challenging later in life.

What can be done about it?

Surgery is the method to repair hypospadias. Taking medicine won't help, and the problem won't get better by itself. The surgery moves the hole to the tip. If your child's penis is also curved or bent, we can straighten the penis during the same surgery.

1 of 2

To Learn More

- Urology
206-987-2509
- Ask your child's healthcare provider
- seattlechildrens.org

Free Interpreter Services

- In the hospital, ask your nurse.
- From outside the hospital, call the toll-free Family Interpreting Line, 1-866-583-1527. Tell the interpreter the name or extension you need.



Seattle Children's®
HOSPITAL • RESEARCH • FOUNDATION

Hypospadias Repair: Care After Surgery

What is the best age for my child to have this surgery?

In most cases, we repair hypospadias between 6 and 18 months of age. We recommend surgery during this age range, because your baby's heart and lungs have matured, and it is before the age in which children develop memory.

What happens during surgery?

The technique the surgeon uses will depend on where the hole where pee comes out (the meatus) is on the penis shaft at birth. The goals of the surgery are to place the hole at or near the tip of the penis and to correct any bend. The surgeon will talk with you beforehand about the surgery plan.

What happens after surgery?

After surgery, keep your child comfortable and germ-free with medicines. Expect a dressing (bandage) on the penis and a plastic tube called a catheter or stent coming from the tip. The catheter or stent helps to drain urine from the bladder while the penis heals. We will remove it about 1 week after surgery during a clinic visit.

What are the risks of this surgery?

Any surgery carries a few risks. While they are not likely to happen, some of these risks include mild or serious bleeding during or after surgery, infection, swelling of the penis or a hole in another area (fistula). Also, there are risks from general anesthesia (medicine to help your child sleep without pain during the surgery). The doctor (called an anesthesiologist) will discuss these risks with you.

Are there times when surgery should not be done or should be delayed?

If your child's body might not cope well with surgery for a medical reason, we may suggest not doing surgery. Your beliefs and wishes are also important. Some people don't agree with doing surgery on a child's genitals before they are old enough to make their own decision. Talk to your child's healthcare provider if you have questions or concerns.

When do I call?

If you have questions about hypospadias or chordee or surgery to correct them, call the Urology Clinic at **206-987-2509** or use **MyChart** for non-urgent questions.