

Chữa tật lỗ tiểu thấp

Phẫu thuật sửa vị trí lỗ tiểu trên dương vật


Bản thông tin này giải thích về tình trạng lỗ tiểu thấp và phẫu thuật để chữa tật này.

Tật lỗ tiểu thấp là gì?

- Nước tiểu đi ra khỏi cơ thể thông qua một ống nằm trong dương vật có tên là niệu đạo. Tật lỗ tiểu thấp xảy ra khi lỗ mở (lỗ tiểu) không nằm ở đỉnh quy đầu mà lại nằm ở đâu đó dọc theo bên dưới thân dương vật hoặc ở túi da chứa tinh hoàn (biu).
- Tật lỗ tiểu thấp (hypospadias, được phát âm là hai-pơ-SPE-đi-ờs) là một tình trạng rất thường gặp ở trẻ sơ sinh. Các nhà khoa học đang nghiên cứu xem liệu tình trạng này có liên quan đến di truyền (gen) hay không. Chúng tôi chưa biết cụ thể nguyên nhân gây tật lỗ tiểu thấp là gì.

Dương vật không bị tật lỗ tiểu thấp (lỗ tiểu ở đỉnh quy đầu).

Những nơi có thể xuất hiện lỗ tiểu khi dương vật bị tật lỗ tiểu thấp.



Tại sao lỗ tiểu thấp lại là một vấn đề?

- Nếu lỗ tiểu nằm bên dưới thân dương vật thì con bạn có thể khó kiểm soát được dòng nước tiểu.
- Tật lỗ tiểu thấp cũng có thể gây vấn đề về khả năng có con (sinh sản) khi trẻ lớn lên. Lỗ tiểu phải nằm ở hoặc gần đầu dương vật mới có thể đưa tinh trùng vào trong âm đạo lúc quan hệ tình dục.
- Không những thế, ở một số trẻ bị tật lỗ tiểu thấp thì dương vật còn bị cong khi cứng lên (cương cứng). Chứng cong dương vật có thể khiến cho việc quan hệ tình dục với người khác rất khó khi trẻ lớn lên.

Dị tật này được điều trị bằng cách nào?

Tật lỗ tiểu thấp được điều trị bằng phẫu thuật. Dùng thuốc sẽ không có tác dụng, và vấn đề này cũng sẽ không tự cải thiện được. Phẫu thuật nhằm đưa lỗ tiểu đến đỉnh quy đầu. Nếu dương vật của con bạn cũng bị cong hay uốn thì chúng tôi có thể sửa lại tật đó trong cùng cuộc phẫu thuật.

Để biết thêm thông tin

- Khoa Tiết niệu
206-987-2509
- Hỏi người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con bạn
- seattlechildrens.org

Dịch vụ thông dịch miễn phí

- Nếu ở bệnh viện, hãy hỏi y tá của bạn.
- Nếu ở bên ngoài bệnh viện, hãy gọi Đường dây Thông dịch dành cho Gia đình miễn phí theo số 1-866-583-1527. Báo cho thông dịch viên biết tên hay số máy lẻ của người bạn cần gặp.

Tuổi nào là tốt nhất cho con tôi thực hiện phẫu thuật?

Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ chữa tật lổ tiểu thấp khi trẻ ở khoảng từ 6 đến 18 tháng tuổi. Chúng tôi khuyến nghị thực hiện phẫu thuật vào khoảng tuổi này bởi vì tim và phổi của con bạn đã phát triển đầy đủ nhưng trẻ chưa đủ lớn để phát triển trí nhớ.

Quá trình phẫu thuật sẽ diễn ra như thế nào?

Phương pháp phẫu thuật mà bác sĩ chọn sử dụng sẽ phụ thuộc vào vị trí lổ tiểu của con bạn lúc chào đời. Mục đích của phẫu thuật là đặt lổ tiểu vào hay gần đầu dương vật và chỉnh sửa tình trạng cong dương vật, nếu có. Bác sĩ phẫu thuật sẽ trao đổi với bạn về kế hoạch phẫu thuật trước khi thực hiện.

Sau phẫu thuật thì sao?

Sau phẫu thuật, con bạn cần được giúp cảm thấy thoải mái và dùng thuốc để ngăn ngừa nhiễm trùng. Dương vật của trẻ sẽ được băng lại (băng gạc) và có một ống nhựa gọi là ống thông hoặc ống đỡ nổi ra từ đầu dương vật. Ống thông hoặc ống đỡ giúp thoát nước tiểu từ bàng quang trong khi chờ dương vật hồi phục sau phẫu thuật. Chúng tôi sẽ tháo ống này ra khoảng 1 tuần sau phẫu thuật khi trẻ tới tái khám tại phòng mạch.

Các rủi ro của phẫu thuật là gì?

Bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng có vài rủi ro. Dù hiếm gặp, một số rủi ro có thể xảy ra bao gồm chảy máu nhẹ hoặc nghiêm trọng trong hay sau khi phẫu thuật, bị nhiễm trùng, sưng dương vật hoặc xuất hiện một lổ (lổ rò) ở chỗ khác. Ngoài ra, cũng có rủi ro từ thuốc gây mê toàn thân (thuốc giúp con bạn ngủ để không thấy đau trong khi phẫu thuật). Bác sĩ gây mê sẽ trao đổi với bạn về các rủi ro này.

Có trường hợp nào không nên tiến hành phẫu thuật hoặc nên trì hoãn phẫu thuật không?

Nếu có lý do y tế để nghĩ rằng cơ thể con bạn có thể không chịu nổi việc phẫu thuật thì chúng tôi có thể đề nghị không thực hiện phẫu thuật. Các niềm tin, tín ngưỡng và nguyện vọng của bạn cũng rất quan trọng. Một số người không đồng ý với việc thực hiện phẫu thuật trên bộ phận sinh dục của một đứa trẻ trước khi trẻ đủ tuổi để tự quyết định. Hãy trao đổi với bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho con bạn nếu có câu hỏi hay quan ngại.

Khi nào tôi cần gọi bệnh viện?

Nếu bạn có thắc mắc về tật lổ tiểu thấp hay dương vật cong hoặc về phẫu thuật chỉnh sửa các tật này thì vui lòng gọi Khoa Tiết niệu theo số **206-987-2509** hay sử dụng tài khoản **MyChart** cho các câu hỏi không khẩn cấp.

Hypospadias Repair

Surgery to correct the urethra on a penis


This handout explains the condition hypospadias and the surgery to correct it.

What is hypospadias?

- Pee (urine) comes out of a tube in the penis called a urethra. Hypospadias occurs when the opening (meatus) of the urethra is not at the very tip, but somewhere along the underside of the penis or on the sac of skin containing the testicles (scrotum).
- Hypospadias (hye-peh-SPAY-dee-iss) is very common in newborns. Scientists are researching to see if there is a hereditary (genetic) link. We do not know the exact cause of hypospadias.

A penis with no hypospadias (the opening is at the tip).

Places where the opening can be on a penis with hypospadias.



Why is hypospadias a problem?

- If the hole is on the underside of the penis, it can be hard for your child to control their urine stream.
- Hypospadias can also cause problems with the ability to make a baby later in life (fertility). The hole needs to be at or near the tip of the penis to deposit sperm during vaginal sex.
- Also, some children with hypospadias have a bent penis (chordee) when the penis gets hard (an erection). Chordee can make sex with other people challenging later in life.

What can be done about it?

Surgery is the method to repair hypospadias. Taking medicine won't help, and the problem won't get better by itself. The surgery moves the hole to the tip. If your child's penis is also curved or bent, we can straighten the penis during the same surgery.

1 of 2

To Learn More

- Urology
206-987-2509
- Ask your child's healthcare provider
- seattlechildrens.org

Free Interpreter Services

- In the hospital, ask your nurse.
- From outside the hospital, call the toll-free Family Interpreting Line, 1-866-583-1527. Tell the interpreter the name or extension you need.

What is the best age for my child to have this surgery?

In most cases, we repair hypospadias between 6 and 18 months of age. We recommend surgery during this age range, because your baby's heart and lungs have matured, and it is before the age in which children develop memory.

What happens during surgery?

The technique the surgeon uses will depend on where the hole where pee comes out (the meatus) is on the penis shaft at birth. The goals of the surgery are to place the hole at or near the tip of the penis and to correct any bend. The surgeon will talk with you beforehand about the surgery plan.

What happens after surgery?

After surgery, keep your child comfortable and germ-free with medicines. Expect a dressing (bandage) on the penis and a plastic tube called a catheter or stent coming from the tip. The catheter or stent helps to drain urine from the bladder while the penis heals. We will remove it about 1 week after surgery during a clinic visit.

What are the risks of this surgery?

Any surgery carries a few risks. While they are not likely to happen, some of these risks include mild or serious bleeding during or after surgery, infection, swelling of the penis or a hole in another area (fistula). Also, there are risks from general anesthesia (medicine to help your child sleep without pain during the surgery). The doctor (called an anesthesiologist) will discuss these risks with you.

Are there times when surgery should not be done or should be delayed?

If your child's body might not cope well with surgery for a medical reason, we may suggest not doing surgery. Your beliefs and wishes are also important. Some people don't agree with doing surgery on a child's genitals before they are old enough to make their own decision. Talk to your child's healthcare provider if you have questions or concerns.

When do I call?

If you have questions about hypospadias or chordee or surgery to correct them, call the Urology Clinic at **206-987-2509** or use **MyChart** for non-urgent questions.